

Cancer différencié de la thyroïde : Expérience du service d'endocrinologie et cas particuliers

NE. Haraj, S. El Aziz, A. Chadli

Service d'endocrinologie. CHU Ibn Rochd. Faculté de médecine et de pharmacie. Université Hassan II, Casablanca. MAROC

INTRODUCTION

✓ Le cancer de la thyroïde est le plus fréquent des cancers des glandes endocrines. Son pronostic est souvent favorable.

✓ L'objectif de l'étude est d'étudier les caractéristiques des patients suivis pour cancer différencié de la thyroïde (CDT), évaluer le taux de récurrences et voir les particularités de notre série

PATIENTS ET METHODE

✓ Etude rétrospective de 392 dossiers de patients suivis pour cancer différenciés de la thyroïde au service d'endocrinologie du CHU IBN ROCHD entre 1986-2015


✓ L'analyse des données a été faite par le logiciel SPSS.16

RESULTATS

LES CARACTERISTIQUES DES PATIENTS DE LA COHORTE

Caractéristiques	Chiffres
Age moyen	44 ± 12.17 ans
Sexe	Prédominance féminine 93 %
Type de chirurgie	Thyroïdectomie totale: 93 %
Irathérapie	71,2 %

TYPE HISTOLOGIQUE



✓ Le **risque de rechute** était classé faible (54%), intermédiaire (27%) et élevé (19%)

✓ L'**irathérapie** a été indiquée dans le groupe à faible risque (51,9% des cas) et dans le groupe risque intermédiaire (88%). La TSH était freinée par rapport à l'objectif dans 24 %

✓ La **qualité de vie** était particulièrement altérée chez les patients avec irathérapie à forte dose

✓ La **réponse thérapeutique** au traitement a été excellente dans le groupe faible risque dans 77% des cas, dans le groupe risque intermédiaire dans 34,8% des cas et dans le groupe à risque élevée dans 22,6% des cas.

✓ Le cancer différencié de la thyroïde était associé à une **thyroïdite lymphocytaire** dans 14,1% et à une **hyperthyroïdie** dans 3,38%.

CONCLUSION

■ Dans notre série on note un surtraitement des patients (indications d'irathérapie, sa dose et objectifs de TSH), qui peut avoir un retentissement négatif sur la qualité de vie.

■ Ceci nécessite un changement des attitudes à la lumière des nouvelles recommandations qui vont vers un traitement moins agressif.