

Profil étiologique de l'hyperthyroïdie

I. Bayar^a (Dr), A. Mzabi^a (Dr), A. Rezgui^a (Dr), B. Mrad^a (Dr), M. Kermani^a (Dr), H. Mhiri^a (Dr), F. Ben Fredj Ismail^a (Dr), C. Kechrid Laouani^a (Pr)

^a Service Médecine Interne, Hôpital Sahloul, Sousse, TUNISIE

Objectif


Déterminer le profil étiologique de l'hyperthyroïdie dans un service de Médecine interne.

Patients et Méthodes


Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive de 50 dossiers de patients ayant une hyperthyroïdie, colligés entre 1997 et 2014 au service de médecine interne de l'hôpital Sahloul.

Résultats


Répartition selon le sexe



Circonstances De Découverte



Profil étiologique



Le traitement était basé sur les antithyroïdiens de synthèse (44 cas), les bêtabloquant (50 cas), l'iode radioactif (42 cas) et la chirurgie (25 cas).

Discussion

- Plusieurs étiologies peuvent être à l'origine d'une hyperthyroïdie.
- Une iatrogénie doit être éliminée d'emblée.
- La maladie de Basedow reste la cause la plus fréquemment incriminée dans l'apparition d'une hyperthyroïdie.