

L'évolution de la fréquence des hypoglycémies et leurs caractéristiques chez des diabétiques de type 2 insulino-traités passés aux analogues de l'insuline.

C. Chaari (Mme), S. Mhidhi (Mlle), H. Abdessalem (Mme), S. Hamdi (Mlle), M. Ali (Pr), F. Ben Mami (Pr)

Introduction






Les analogues de l'insuline sont connus pour avoir moins d'effets secondaires que l'insuline conventionnelle comme l'hypoglycémie et la prise pondérale. On se propose dans ce travail de voir les caractéristiques des hypoglycémies chez les diabétiques de type 2 insulino-traités passés aux analogues de l'insuline.

Méthodes

Il s'agit d'une étude rétrospective longitudinale sur une période de 18 mois portant sur 61 patients diabétiques de type 2 insulino-traités puis passés aux les analogues de l'insuline suivis à l'institut national de nutrition de Tunis.

Résultats

| | |
|--|---------------|
| Age moyen | 60,7±10,2 ans |
| Sexe ratio | 0,96 |
| Durée médiane de traitement par insuline conventionnelle | 6 ans |



Conclusion

Nos résultats concordent avec la littérature ce qui encouragerait la prescription des analogues malgré leur coût élevé puisqu'ils diminuent le coût direct et indirect qu'engendrent les hypoglycémies.