

Fréquence des pathologies auto-immunes au cours du diabète type 1

M. Bennour*^a (Dr), I. Rojbi^a (Dr), I. Rezgani^a (Dr), I. Ben Nacef^a (Dr), N. Mchirgui^a (Dr), K. Khiari^a (Dr), N. Ben Abdallah^a (Dr)
^a unité d'endocrinologie, service de médecine interne, hôpital Charles Nicolle, faculté de médecine de Tunis, Tunis, TUNISIE

Introduction :

Le diabète de type 1 (DT1) s'accompagne fréquemment d'autres maladies auto-immunes (MAI). A travers ce travail nous avons cherché la fréquence des différentes maladies auto-immunes associées à ce type de diabète.

Méthodes :

Il s'agit d'une étude rétrospective incluant 77 diabétiques de type 1 suivis dans notre service entre 2008 et 2016.


Résultats :

- Notre population comportait 45 hommes et 32 femmes
- L'âge moyen = 29 ans (extrêmes =).
- La durée moyenne d'évolution du diabète = 10,7 ans.


Les différentes maladies auto-immunes associées au DT1:

Parmi les 77 diabétiques, 12 présentent d'autres maladies auto-immunes réparties comme suit:

1) Selon le type de l'atteinte auto-immune:



2) Selon le sexe:



Le DT1 a précédé les dysthyroïdies dans 61,5 % des cas

Conclusion :

La fréquence des maladies auto-immunes chez le diabétique type 1, pouvant parfois entrer dans le cadre de polyendocrinopathie auto-immune, incite à les dépister à la découverte du diabète. Ceci permet une prise en charge précoce