

Évolution de la population transgenre référée en endocrinologie : Expérience du centre TransEst au CHRU de Nancy

Véronique Pascal[‡] (Dr), Eva Feigerloval[‡] (Dr), Marie-Odile Ganne Devonec (Dr), Marc Klein (Pr), Bruno Guerci (Pr)
Service d'Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition, CHRU Nancy, Hôpital Brabois Adultes, Vandoeuvre-lès-Nancy, France
[‡] - Contribution égale

Introduction

- ❖ La littérature montre une augmentation du nombre des sujets référés pour la dysphorie de genre (DG) dans les différents centres experts avec une évolutivité de sex-ratio.
- ❖ Les données épidémiologiques n'ont pas été à présent étudiées de façon formelle en France.

Objectifs


- ❖ Décrire l'évolution de la population transgenre référée dans le service d'endocrinologie au CHRU de Nancy (activité transgenre depuis 1990's)

Méthodes

- ❖ Etude rétrospective, descriptive, monocentrique
- ❖ Échantillon des personnes référées par un psychiatre pour la dysphorie de genre, selon les critères diagnostiques du DSM-V, dans le service d'endocrinologie au CHRU de Nancy entre janvier 2002 et décembre 2017 sans modifications des modalités du recrutement.


Analyse descriptive

Évolution du nombre de nouvelles consultations entre 2002 et 2017




- ❖ 224 sujets (M -> F, n=134) référés entre 2002 et 2017
- ❖ Taux moyen: 7.2 sujets par année jusqu'en 2013
27.3 sujets par année à partir de 2014

Évolution du sexe ratio des sujets référés pour une dysphorie de genre entre 2006 et 2017




Inversement du sex-ratio au profit du sexe de naissance féminin (homme transgenre) observé à partir de l'année 2016

Âge moyen lors de la 1^{ère} évaluation



- ❖ Sujets M -> F: 35.6 ± 11.2 ans
- ❖ Sujets F -> M: 24.2 ± 6.7 ans } P<0.05

Distribution des âges lors de la 1^{ère} évaluation



Conclusion

En concordance avec la littérature, nos observations suggèrent un changement de sex-ratio au profit du sexe de naissance féminin, sous réserve d'un biais de l'étude monocentrique.

Implications

- ❖ La manifestation de la dysphorie de genre semble différente entre les M->F et F->M.
- ❖ L'intérêt d'études épidémiologiques est justifié reconnaissant les modifications actuelles du système de classification.

Références:

- Aitken M, et al (2015). Evidence for an altered sex ratio in clinic-referred adolescents with gender dysphoria. *Journal of Sexual Medicine*, 12, 756–763. doi:10.1111/jsm.12817
- Steensma TD, et al (2018): Evidence for a Change in the Sex Ratio of Children Referred for Gender Dysphoria: Data from the Center of Expertise on Gender Dysphoria in Amsterdam (1988–2016), *Journal of Sex & Marital Therapy*; <https://doi.org/10.1080/0092623X.2018.1437580>