

Insuffisance surrénalienne dans un service de médecine interne : à propos de 17 cas

Fraj A, Tounsi H, Chaabène I, Garbouj W, Amri R, Ben Ahmed I, Ben Ammou B, Wali J

Service de médecine interne, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri Nabeul, Tunisie

Introduction :

- L'insuffisance surrénalienne (IS) une pathologie rare et potentiellement mortelle en l'absence de traitement.
- Notre objectif est de déterminer les caractéristiques cliniques et biologiques et le profil étiologique de l'IS.

Patients et méthodes :

- Etude rétrospective colligeant 17 patients suivis pour IS dans un service de médecine interne sur une période de 7 ans entre 2010 et 2017.

Résultats :

- Il s'agit de 7 hommes et 10 femmes d'âge moyen à 36,3 ans (13 ans - 70 ans).
- Les signes cliniques sont réparties dans la figure 2 et les signes biologiques dans la figure 3.
- L'IS était d'origine centrale chez 7 patients et en rapport avec une maladie d'Addison chez les autres dont les étiologies sont réparties dans la figure 4.

Figure1: répartition de sexe




Figure 4: les étiologies de IS




FIGURE2: SIGNES CLINIQUES





Figure3: signes biologiques



Discussion :

- L'IS est une pathologie rare, probablement sous diagnostiquée étant le manque de spécificité du tableau clinique surtout dans les formes chroniques.
- La décompensation aiguë est létale en l'absence de traitement précoce et adapté.