Dysthyroïdies du sujet âgé : Profil clinique, biologique, évolutif et thérapeutique

N. Guizani^{*a} (Dr), A. Mzabi^a (Dr), F. Mkaouar^a (Dr), G. Sboui^a (Dr), A. Rezgui^a (Dr), J. Anoun^a (Dr), M. Karmani^a (Dr), F. Ben Fredja^a (Dr), C. Laouani^a (Dr)

^a Service de médecine interne, CHU Sahloul, Sousse, TUNISIE

Objectif :

Décrire les particularités cliniques, biologiques, évolutives et thérapeutiques des dysthyroïdies du sujet âgé.

Patients et méthodes :

Étude rétrospective incluant les sujets âgés suivis pour une dysthyroïdie au service de médecine interne du CHU sahloul sur une période allant de Janvier 2014 au Décembre 2017.

Résultats :

- ❖ 17 patients
- ❖ l'âge moyen était de 72 ans (65 -75 ans)
- ❖ une prédominance féminine (70 %).
- ❖ La pathologie thyroïdienne était dominée par l'hypothyroïdie (85 % des cas).
- ❖ Le délai moyen de consultation était de 2 ans et demi.

Les principales manifestations cliniques de l'hypothyroïdie :

❖ Les principaux symptômes de l'hyperthyroïdie étaient :

- une asthénie (2 cas),
- des palpitations (1 cas)
- un amaigrissement (2 cas)

❖ Les principales complications de l'hypothyroïdie :

- ✓ l'insuffisance cardiaque (23% des cas)
- ✓ l'hypercholestérolémie (20 % des cas)

❖ Le traitement de la dysthyroïdie était basé sur :

- L-thyroxine à dose progressive (15 cas)
- les antithyroïdiens de synthèse (1 cas)
- l'irathérapie (1 cas)
- la chirurgie (1 cas).

Discussion :

- ❑ Les dysthyroïdies sont fréquentes chez le sujet âgé.
- ❑ Leur symptomatologie est souvent trompeuse.
- ❑ Un intérêt particulier du dosage hormonal au moindre doute afin d'instaurer le traitement adéquat à temps et prévenir les complications qui peuvent compromettre le pronostic vital de la personne âgée.